



## ENERLYTE® PLUS

Supplément nutritionnel réhydratant effervescent

### Composition analytique, pour un sachet de 100 g :

Protéine brute 5,4 %, Matière grasse brute 1,1 %, Cellulose Brute < 2 %, Humidité < 3%, Cendres Brutes 18,3 %, Sucres totaux 73,84 %, Sodium 6,24 %, Potassium 2,11 %, Chlorure 4,18 %.

### Ingrédients, pour un sachet de 100 g :

Sélénométhionine\* (agrément UE : 3b8.11) : 50 mg, Vitamine E support : 50mg, *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 (agrément UE : E 1705) :  $5.10^9$  germes, Poudre de Lactoserum spray, Gomme d'acacia, Farine de riz, Farine de caroube. Lactose, Glycine, Chlorure et Bicarbonate de sodium, Chlorure de potassium, Acide citrique, Ethylvanilline. \*produite par *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 (levure sélénée inactivée).

**Propriétés :** Enerlyte® plus, supplément nutritionnel réhydratant effervescent, associe de manière optimale les éléments indispensables à la lutte contre les troubles digestifs (diarrhée) ou liés au sevrage :

- Préparation aisée : Effervescence.
- Buvée facilitée : Arôme vanille.
- Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau: Apport en ions (Na, K et Cl).
- Assimilation favorisée: Gomme d'acacia.
- Contribution à la protection des muqueuses intestinales : Vitamine E et Sélénium.
- Aide à l'amélioration des fonctions digestives et de la consistance des selles: Gomme d'acacia, Farines de riz et de caroube.
- Réensemencement du tube digestif: Souche de bactéries lactiques non modifiée (*Enterococcus faecium*).

**Utilisation :** En cas de troubles digestifs (diarrhée), pendant et après ceux-ci.

Stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau, des veaux, agneaux, chevreaux.

Distribuer dès les premiers signes de diarrhée, jusqu'à disparition complète des troubles.

**Mode d'emploi :** Voie orale. Un sachet de 100 grammes sera dissout dans 2 litres d'eau tiède.

- Veaux : Administrer 3 repas de 2 litres de buvée à 12h d'intervalle.
- Agneaux, chevreaux : Administrer 3 repas de 1 litre de buvée à 12h d'intervalle.

La buvée pourra être préparée dans le lait.

Donner la buvée rapidement après sa préparation.

Le retour à l'alimentation lactée se fait sans phase de transition.

**Précautions d'emploi :** Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire.

Ne pas dépasser 7 jours d'administration.

**Catégorie :** Produit à objectif nutritionnel particulier.

**Conservation :** Tenir à l'abri de l'humidité. Conserver hors de portée des enfants.

La date de péremption et le numéro de lot sont imprimés sur l'emballage.

**Présentation :** Sachets de 100 g